

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

от « 13 » 04 2010г.

№ 228-1

г. Махачкала

«О тропониновых тестах»

Проведенный анализ за 2009 г и I квартал 2010г показал, что в лечебных учреждениях республики до сих пор не налажена работа по диагностированию острого инфаркта миокарда у лиц, поступающих в лечебные учреждения с диагнозом острый коронарный синдром, ИБС, нестабильная стенокардия с помощью тропониновых тестов в соответствии со стандартами. Нет анализа и контроля за их проведением. Руководители ЛПУ не уделяют должного внимания ранней диагностике острого инфаркта миокарда с помощью тропониновых тестов.

В связи с этим, в целях ранней диагностики острого инфаркта миокарда,-

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Начальнику УЗ г.Махачкала Черкесовой Л.Г главным врачам РКБ, РБ№2 - ЦЭСМП, городских и районных ЛПУ, МСЧ:
 - 1.1 До 30 апреля 2010г, представить информацию по состоянию использования тропониновых тестов по ЛПУ, объему их закупок (приложение №1)
 - 1.2 Обеспечить жесткий контроль за их использованием, обеспечить ежеквартальное предоставление аналитической информации о результатах их использования.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника лечебного отдела Магомедову З.К.

МИНИСТР



И.А МАМАЕВ

Анализ использования тропониновых тестов

1. Наличие в поликлинике, стационаре, скорой помощи тропониновых тестов, если нет, то почему.
2. При наличии – сколько есть (накладную), кто производитель.
3. Сколько проведено тропониновых тестов:
Поликлинике – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Скорой помощи –при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Стационаре – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
4. Сколько положительных тропониновых тестов:
Поликлинике – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Скорой помощи –при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Стационаре – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
5. Сколько ложноположительных тропониновых тестов:
Поликлинике – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Скорой помощи –при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Стационаре – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
6. Сколько отрицательных при наличии ОИМ:
Поликлинике – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Скорой помощи –при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии
Стационаре – при Остром коронарном синдроме
при ИБС. Нестабильной стенокардии